

Ergebnisse


Tabelle 3: Einteilung in BMI Gruppen

BMI Kategorien			
BMI	n	%	
< 20,0	17	8,5	Untergewicht
20,0 – 24,9	76	38,0	Normalgewicht
25,0 – 30,0	60	30,0	Übergewicht
30,1 – 35,0	35	17,5	Adipositas Grad 1
> 35,0	12	6	Adipositas Grad 2 (bis 39,9)
total	200	100,0	

Nach WHO Report 1995

Mortalität

Abbildung 5: Mortalität in einem Jahr




Ergebnisse

Tabelle 5: Einschätzung des Ernährungszustandes mittels Screening Instrumenten

	Anwendbarkeit n (%)	Ernährungszustand		
		hohes Risiko	mittleres Risiko	geringes Risiko
MUST	198 (99,0)	8,6%	7,6%	83,8%
		Risiko für Mangelernährung	Wöchentl. Wiederholtes Screening	kein Risiko für Mangelernährung
NRS	198 (99,0)	8,6%	40,9%	50,5%
		mangelernährt	Risiko für Mangelernährung	normaler Ernährungszustand
Bewohner	138 (69,0)	15,2%	53,6%	31,2%
Pflege	188 (94,0)	15,4%	57,4%	27,1%

Ergebnisse

Abbildung 6: Mortalität in den drei Kategorien des MNA in einem Jahr



Ergebnisse

Abbildung 7: Entwicklung des Vitamin D Blutstatus innerhalb eines Jahres

